



---

## Fumo e carcinoma pancreatico familiare

---

**Data** 01 gennaio 2004  
**Categoria** oncologia

---

Il 10% circa dei carcinomi pancreatici sono ereditari, ma i fattori alla base della oncogenesi nel carcinoma pancreatico familiare non sono noti.

I Ricercatori della Divisione di Gastroenterologia dell' University of Washington negli Usa hanno valutato i fattori di rischio per il carcinoma pancreatico familiare in 251 membri di 28 famiglie.

Tutte le famiglie comprendevano 2 o più membri con carcinoma pancreatico.

Il fumo è risultato essere un fattore di rischio indipendente per il carcinoma pancreatico familiare ( odds ratio: 3,7 ) ; i maschi ed i soggetti d'età inferiore a 50 anni hanno presentato un odds ratio ( OR) di 5,2.

I fumatori hanno sviluppato il tumore al pancreas una decade prima dei non fumatori ( 59,6 versus 69,1 anni ).

Il diabete non si è rivelato un fattore di rischio per il carcinoma pancreatico , sebbene il diabete sia risultato associato alla displasia pancreaticata.

I membri di famiglie in cui il carcinoma pancreatico è ereditario non dovrebbero fumare.

Gastroenterology 2003; 124:1292-1299