



## Insufficienza cardiaca in fase avanzata e risincronizzazione cardiaca

**Data** 15 ottobre 2004  
**Categoria** cardiovascolare

I COMPANION Investigators ( Comparison of Medical Therapy Pacing and Defibrillation in Heart Failure ) hanno verificato l'ipotesi che:  
" la terapia di risincronizzazione cardiaca mediante stimolazione biventricolare con un pacemaker con o senza un defibrillatore potesse ridurre il rischio di morte e di ospedalizzazione tra i pazienti con insufficienza cardiaca cronica in fase avanzata, e potesse ritardare la conduzione intraventricolare ".

Sono stati arruolati 1.520 pazienti con insufficienza cardiaca, causata da cardiomiopatia ischemica o non-ischemica, in classe NYHA III o IV, e con un intervallo QRS di almeno 120 msec.

Questi pazienti sono stati assegnati in modo random a ricevere, in un rapporto di 1:2:2, terapia farmacologica ( diuretici, Ace inibitori, beta-bloccanti e Spironolattone ) da sola o in associazione alla terapia di risincronizzazione con un pacemaker o con un pacemaker-defibrillatore.

L'end point primario era rappresentato dalla mortalità o dalla ospedalizzazione per insufficienza cardiaca. La terapia di risincronizzazione cardiaca con un pacemaker ha ridotto il rischio dell'end point primario rispetto alla terapia farmacologica ( hazard ratio, HR: 0,81;  $p = 0,014$  ).

Lo stesso risultato è stato ottenuto anche nel gruppo sottoposto a terapia di risincronizzazione cardiaca con un pacemaker-defibrillatore ( HR: 0,80;  $p = 0,01$  ). Il rischio combinato di morte o di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca è stato ridotto del 34% nel gruppo pacemaker (  $p < 0,002$  ) e del 40% nel gruppo pacemaker-defibrillatore (  $p < 0,001$  ). L'end point secondario di morte per tutte le cause è stato ridotto del 24% nel gruppo pacemaker (  $p = 0,059$  ) e del 36% nel gruppo pacemaker-defibrillatore (  $p = 0,003$  ). Questo studio ha dimostrato che i pazienti con insufficienza cardiaca cronica, in fase avanzata, e con un intervallo QRS prolungato, possono trarre beneficio dalla risincronizzazione cardiaca, soprattutto se il pacemaker è associato ad un defibrillatore.

fonte: N Engl J Med 2004; 350: 2140-2150

Link: <http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/350/21/2140>