



Le donne isterectomizzate sono ad aumentato rischio di tumore della tiroide nei primi 2 anni

Data 30 marzo 2003
Categoria oncologia

I Ricercatori dell'University of Tampere (Finlandia) hanno studiato la relazione tra isterectomia e tumore della tiroide.

Lo studio ha riguardato 17.900 donne, sottoposte ad isterectomia tra il 1986 ed il 1995, e seguite fino al 1997.

Sono stati identificati 118 casi di tumore della tiroide, di cui 103 di tipo papillare e 15 follicolare o medullare.

L'incidenza di carcinoma tiroideo è risultata significativamente elevata (SIR=1,38; CI= 1,15-1,64).

L'aumento nell'incidenza di tumore tiroideo non era dipendente dall'entità dell'operazione, ma dal periodo di osservazione.

L'aumento dell'incidenza di carcinoma tiroideo è stato osservato 0,5-1,4 anni dopo l'isterectomia (SIR=2; CI=1,31-2,93). Successivamente si è avuta una diminuzione (SIR= 1,30; CI= 0,99-1,67).

Non è stata osservata differenza nell'incidenza di tumore della tiroide dopo isterectomia con o senza ooforectomia.

Questo studio ha confermato la maggiore incidenza di carcinoma tiroideo nelle donne sottoposte ad isterectomia nei primi 2 anni dopo l'operazione.