



Modifiche AIC in GU: Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar, Lortaan

Data 27 febbraio 2009
Categoria professione

Gazzetta Ufficiale: Modificate le indicazioni terapeutiche di Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar, Lortaan.

Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar:


Le nuove indicazioni terapeutiche, uguali per tutti e tre questi medicinali (associazioni di losartan + idroclorotiazide), sono:

"Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli".

Lortaan:

Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

"Trattamento dell'ipertensione essenziale. Trattamento della patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria ≥ 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva. Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ≥ 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 40% e devono essere stabilizzati con il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Riduzione del rischio di ictus in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG (vedere paragrafo 5.1 Studio LIFE, Razza)".

 [Neo-Lotan Plus](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401045.htm)
[Forzaar](#)
[Hizaar](#)
[Lortaan](#)