



Promemoria: i mucolitici sono vietati sotto i due anni di età'

Data 11 dicembre 2011
Categoria medicina_legale

Ricordiamo che l' AIFA ha emesso un provvedimento restrittivo a proposito dei farmaci mucolitici, acetilcisteina, carbocisteina, ambroxolo, bromexina, sobrerolo, neltexina, erdoseina e telmesteina, contenuti in numerosi medicinali che sono per la maggior parte dispensabili senza obbligo di ricetta.

Questi farmaci hanno attività mucolitica e fluidificante e sono per lo più prescritti, o somministrati dal genitore, nel trattamento delle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

In Francia sono stati evidenziati aumento dei casi di ostruzione respiratoria e di peggioramento di patologie respiratorie nei bambini di età inferiore a 2 anni trattati con i mucolitici, a causa della minor capacità di drenaggio bronchiale a quest'età. Si è riscontrato peggioramento di bronchiolite, aumento di tosse, aumento di secrezioni bronchiali, dispnea, difficoltà respiratoria, vomito viscoso che spesso hanno obbligato all'ospedalizzazione. È stato quindi controindicato l'uso di tali farmaci sotto i due anni d'età'.

DanieleZamperini