

Atomoxetina e pressione arteriosa

Data 19 dicembre 2011 Categoria scienze_varie

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL MEDICINALE STRATTERA (ATOMOXETINA) E IL RISCHIO DI AUMENTO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA E DELLA FREQUENZA CARDIACA

STRATTERA può alterare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Si prega di tenere in considerazione le seguenti nuove raccomandazioni:

 STRATTERA non deve essere usato in pazienti con gravi patologie cardiovascolari o cerebrovascolari le cui condizioni sono destinate a peggiorare nei casi di aumenti clinicamente importanti della pressione sanguigna o della frequenza cardiaca (come ad esempio un aumento della pressione sanguigna di 15-20 mmHg od un aumento della frequenza cardiaca di 20 battiti al minuto). Vedere di seguito per ulteriori informazioni.

 STRATTERA deve essere usato con cautela nei pazienti le cui condizioni cliniche preesistenti potrebbero essere aggravate da aumenti della pressione sanguigna o della frequenza cardiaca, così come nei pazienti con ipertensione, tachicardia, o con malattia cardiovascolare o cerebrovascolare.

 Si raccomanda di fare una anamnesi accurata e un esame fisico per valutare la presenza di malattia cardiaca nei pazienti che vengono presi in considerazione per il trattamento con atomoxetina. I pazienti devono essere sottoposti ad una ulteriore valutazione specialistica cardiologica se i risultati iniziali suggeriscono tale storia o presenza di una malattia cardiaca.

 Si raccomanda anche di controllare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e di registrarle (per esempio su un grafico percentile) in tutti i pazienti prima di iniziare il trattamento con STRATTERA e, durante il trattamento, dopo ogni aggiustamento della dose e successivamente almeno ogni 6 mesi per individuare possibili aumenti clinicamente importanti. Se i pazienti sviluppano sintomi che suggeriscono una malattia cardiaca durante il trattamento devono essere sottoposti ad una tempestiva valutazione specialistica cardiologica.

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli eventi avversi dovuti ai medicinali per il trattamento dell'ADHD, seguire le linee guida europee all'allegato 4 (http://goo.gl/sRqeX)

Sono ancora disponibili sullo stesso sito dell'Aifa:

Una guida per il medico per la valutazione e il monitoraggio del rischio cardiovascolare quando prescrive Strattera (http://goo.gl/O9XtV)

ed una checklist per le azioni da eseguire prima di prescrivere / dispensare o somministrare Strattera (http://goo.gl/AFaKw)

Fonte:

http://goo.gl/Bd0ZB

A cura di Patrizia laccarino